

NÁVRH NA HOSPITALIZÁCIU PACIENTA

Identifikačné údaje pacienta

Priezvisko		Príbuzní telef.	
Meno, titul		Príbuzní e-mail	
Adresa bydliska		Prepustený do	
Poistovňa		Samoplatca	
Telefón		DG. MKCH	
Email		Ošetrojúci lekár kontakt	

Stav vedomia

- ☐ plne orientovaný, rozumie plne všetkým výzvam
- ☐ občasné stavy dezorientácie, občasné vyhovenie výzvam/vyhovenie výzvam s latenciou
- ☐ dezorientovaný, neschopný vyhovieť výzvam

Kognitívny status

- ☐ bez kognitívneho deficitu
- ☐ mierny kognitívny deficit neinterferujúci s bežným životom
- ☐ organický psychosyndróm/dementný syndróm
- ☐ vyžadujúci chemickú pacifikačnú terapiu

Komunikačné schopnosti

- ☐ bez problémov
- ☐ parciálna porucha komunikácie, parciálna symbolická porucha reči
- ☐ kompletná afázia, mutizmus

Kardiovaskulárny status

- ☐ bez kardiovaskulárneho ochorenia
- ☐ kardiovaskulárne ochorenie kompenzované
- ☐ kardiovaskulárne ochorenie dekompenzované

Respiračný status

- ☐ pacient dýcha spontánne
- ☐ pacient vyžaduje oxygenoterapiu
- ☐ pacient má tracheostomiu

Stravovanie

- ☐ pacient sa stravuje sám
- ☐ pacient sa stravuje sám a vyžaduje špeciálnu diétu, ak áno akú?
- ☐ pacient má zavedenú nasogastrickú sondu/PEG

Vylučovanie

- ☐ pacient je plne kontinentný (stolica aj moč)
- ☐ pacient má inkontinenciu moču
- ☐ pacient má inkontinenciu stolice
- ☐ pacient je „plienkovaný“
- ☐ pacient má zavedený močový katéter
- ☐ pacient má zavedenú kolostómiu/epicystostómiu

Kožný kryt

- ☐ pacient nemá žiadny kožný deficit
- ☐ pacient má pooperačnú ranu hojacu sa p. p. i.
- ☐ pacient má pooperačnú ranu hojacu sa p. s. i. vyžadujúcu si ATB

Schopnosť plnej aktívnej rehabilitácie

- ☐ áno
- ☐ nie/s limitáciami

Vertikalizácia

- ☐ samostatne mobilný bez pomôcok
- ☐ chôdza s pomocou (nemecké barly, francúzske barly, rolátor, G-aparát)
- ☐ nechodiaci, doposiaľ len vertikalizácia do stoja
- ☐ nechodiaci, doposiaľ len vysadenie na lôžku
- ☐ pacient len ležiaci
- ☐ na invalidnom vozíku

Povinné prílohy

- ☐ prepúšťacia správa/predbežná prepúšťacia správa s epikrízou a OA, LA, AA
- ☐ laboratórne výsledky (KO, CRP, biochémia, moč chem. a sed.) nie staršie ako 7 dní

Indikácie prijatia**Všeobecné zdravotná poisťovňa**

- ☐ I60*, I61*, I62*, I63*, I64*, S06*, T09.3, T13.6, M17*, M16*, S72*, T02*, T05*, T06*
M42*, M51*

Dôvera

- ☐ **I60*-I63*** mRS 3-4, nástup na rehabilitáciu do 3 mesiacov priamy preklad z lôžka (do 3 kalendárnych dní, po prepustení z nemocnice kde sa poskytla liečba akútnej fázy ochorenia) pri nasledovných diagnózach:
- ☐ **G61.0, G61.8, A69.2, G35, M17* a M16***

UNION

- ☐ **I60-I63** do 6 mesiacov, **M17* a M16*** a vybrané operácie chrbtice

Kontraindikácie prijatia

- ☐ pacienti akútne vyžadujúci transfúziu liečbu, anémia s Hb pod 90
- ☐ pacienti vyžadujúci komplexný monitoring VF
- ☐ porucha vedomia, vigilná kóma
- ☐ ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespôlupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce
- ☐ dekompenzované psychiatrické ochorenia (akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, halucinácie, suicidálne sklony)
- ☐ dekompenzované neurologické (s prejavmi delíria, zle korigovaná epilepsia, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia, dekompenzovaná demencia s dezorientáciou)
- ☐ závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia, chronické srdcové zlyhávanie ICHS NYHA III., IV., nestabilná angina pectoris, dekompenzovaná arteriálna hypertenzia, zle korigované respiračné ochorenie s rizikom akútnych exacerbácií, pacienti vyžadujúci kontinuálnu oxygenoterapiu), dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy, extrémna obezita
- ☐ akútna tromboflebitída – stavy po hlbokoj trombóze do 3 mesiacov po odznení choroby, po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odznení ochorenia
- ☐ aktívne infekčné ochorenie, febrilné stavy (pacienti vyžadujúci kontinuálnu i. v. ATB terapiu)
- ☐ zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známami pokračovania choroby (MTS)
- ☐ syndróm závislosti na alkohole a na iných omamných látkach (s rizikom rozvoja delíria)
- ☐ rehabilitačná liečba je kontraindikovaná u pacientov so záchytnom multirezistentných kmeňov enterobaktérií, resp. rezistentných na ATB – meropenem, ertapenem – z dôvodu nariadenej izolácie pacienta počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení na základe Odborného usmernenia MZ SR č. 3828/2014 - SZ čl. IV
- ☐ imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami; dekubity a otvorené rany, chronické rany